

brodifacoum fersol

Classe: Raticida de dose única

Grupo Químico: Derivado de hidroxycumarina

Ingrediente Ativo: Brodifacoum

Fórmula Molecular: C₃H₂₃O₂ Br

Número do CAS: 56073-10-0

Registro no M.S.:

- Isca Peletizada: 3.1834.0014.001-8
- Bloco Parafinado: 3.1834.0009.001-0
- Mini Bloco Parafinado: 3.1834.0022.001-1

Apresentação:

- Caixa de 1Kg contendo 40 sachets de 25 g
- Caixa de 1Kg contendo 50 blocos parafinados de 20 g
- Caixa de 1Kg contendo 200 blocos parafinados de 5 g

Todos com caixa de embarque com 12 unidades.

Indicações de Uso: Raticida anticoagulante de dose única, de Segunda geração, a base de brodifacoum.

Formulação:

Isclas peletizadas, prontas para o uso, embaladas em envelopes plásticos de 25 g.
Blocos Parafinados de 20 g.
Mini-Blocos Parafinados de 5 g.

Composição: Brodifacoum 0,005 g
Atrativos, corante, amargante, qsp 100g

Mecanismo de Ação: D

O Brodifacoum funciona como um anticoagulante sanguíneo. Interrompendo o ciclo de formação da Vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue, causando hemorragias. No período de 3 a 10 dias após a ingestão, o animal morre devido a hemorragias internas e externas.

Informações toxicológicas:

DL50 (oral): 0,22 - 0,27 mg / kg

**Contém
Substância
Amargante**

Modo de usar e restrições de uso:

As isclas devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc.

Dependendo do grau de infestação, colocar de 1 a 5 blocos parafinados de 20 g, ou 1 a 3 sachets de 25 ou 2 a 6 mini blocos parafinados em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, próximo aos rodapés, os pontos devem estar distantes 5 metros um do outro, Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas portas-iscas, onde o raticida ficará protegido das intempéries, além de dificultar o acesso de animais não alvo. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a partir do 3º dia após a aplicação, para verificação do consumo e remanejamento locais onde as isclas não forem consumidas.

Restrições de Uso: Produto de uso institucional / por entidades especializadas. Proibida a Venda ao Público.

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito)

Antídoto / Tratamento : Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito.

Telefone de Emergência:

Centro de Controle de Intoxicações: (11) 5012.5311

Telefone da empresa: (11) 4246.6200

Precauções de Uso: Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais. Manter o produto na embalagem original sempre fechada, em local seco e ventilado e afastado de alimentos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Evitar contato com a pele e os olhos. Usar luvas ao manusear o produto. Evitar comer ou beber ao manusear o produto. Não contaminar fontes de água potável com restos do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Devem ser perfuradas e enterradas ou incineradas. Após o manuseio do produto, lavar as mãos com água e sabão. Recolher roedores mortos, enterrá-los ou queimá-los. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

Sinais e sintomas de intoxicação: Se houver ingestão do produto, pode ocorrer náuseas, vômitos, dor abdominal e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina, palidez hemorragias maciças nos casos mais graves, que podem levar à morte.



FERSOL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Rod. Presidente Castello Branco, km 68,5 - CEP: 18120-970 - Município de Mairinque - SP - Brasil - Fone: (11) 4246-6200 - Fax: (11) 4246-6205
www.fersolna.com.br - e-mail: saudepublica@fersol.com.br